何が起きてるのか？

統計？

$\gamma\gamma$ resonance?

$\sigma * Br = 5-10 \text{ fb}$
Large !!

No

Yes

width wide? 45GeV

Yes

No excess in
VV or ff
Invisible decay

1) $\phi \rightarrow aa$ a:NMSSM / Axion
($a \rightarrow \gamma\gamma$) $f_a \sim 1 \text{ TeV}$
 $M_a = 0.1-1 \text{ GeV}$
($a \rightarrow \pi$'s or $\gamma\gamma$)

No

Weak Coupled

3) Heavy Higgs(MSSM),
Singlet
s-Goldstino,
radion (Extra-dim)
KK-graviton (Extra-dim)

4) $\phi \rightarrow \chi\chi$ or $\gamma\gamma$
5) TC

2) strong QED? VBF

Induced
coupling
-> Vector-like
fermion
 $m < 1 \text{ TeV}$

統計?

2016 夏には

$\gamma\gamma$ resonance?

2016年の全データで3つのどこに落ち着くか?

$\sigma * Br = 5-10 \text{ fb}$
Large !!

No

Yes

width wide? 45GeV

Yes

No excess in
VV or ff
Invisible decay

No

Weak Coupled

1) $\phi \rightarrow aa$ a:NMSSM / Axion
($a \rightarrow \gamma\gamma$) $f_a \sim 1 \text{ TeV}$
 $M_a = 0.1-1 \text{ GeV}$
($a \rightarrow \pi$'s or $\gamma\gamma$)

3) Heavy Higgs(MSSM),
Singlet
s-Goldstino,
radion (Extra-dim)
KK-graviton (Extra-dim)
..... 等々

4) $\phi \rightarrow \chi\chi$ or $\gamma\gamma$
5) TC

2) strong QED? VBF

Induced
coupling
-> Vector-like
fermion
 $m < 1 \text{ TeV}$

Expected signal of the other decay modes for the various models
 Branching fraction comparing to $\text{Br}(\phi \rightarrow \gamma\gamma)$ vs current limits

$\phi \rightarrow$	$\sigma^* \text{Br}(13\text{TeV})$) fb	Singlet	SUSY MSSM A	TC	Radi on	KK	Axio n	NM SSM
WW	200	1-10						
ZZ	100	1-10						
tt	4000		100	100- 1000	KK- glu			
gg	10^4	100- 1000		10- 100	100		100	
hh	200							
$\tau\tau$	56		10		10			
ll	3.5					$\gg$ 1		
invisi	800							
$\gamma\gamma$	5-10		X	peaks?		exclude		

10倍以上
感度 UP

2017~2018年
全データ
が必要になってくる

- 1) 黄色
- 3) 緑色
- 5) 橙色

ILCで何ができるか？（おおざっぱ）

$\sigma * Br = 5-10 \text{ fb}$
Large !!

$\gamma\gamma$ resonance?

ILC 500
ILC > 1TeV

No

Yes

width wide? 45GeV

Yes

No excess in
VV or ff
Invisible decay

No

Weak Coupled

3) **Heavy Higgs(MSSM),**
Singlet
s-Goldstino,
radion (Extra-dim)
KK-graviton (Extra-dim)

4) $\phi \rightarrow \chi\chi$ or $\gamma\gamma$
5) **TC**

1) $\phi \rightarrow aa$ **a:NMSSM** / Axion
($a \rightarrow \gamma\gamma$) $f_a \sim 1\text{TeV}$
 $M_a = 0.1-1\text{GeV}$
($a \rightarrow \pi$'s or $\gamma\gamma$)

2) **strong QED? VBF**

Induced
coupling
-> **Vector-like
fermion**
 $m < 1 \text{ TeV}$

2) 超対称性SUSY

様々な可能性のうち
もっとも、期待出来るのが
複数のジェットとアンバランス

消失運動量(ニュートラリーノ起源)
ジェットの運動量(崩壊から)

$$M_{\text{eff}} = m_{\text{ET}} + \sum P_T(\text{jet})$$

標準モデルからのバックグラウンド
ニュートリノを含む
W/Z粒子+ジェット
トップクォーク $\rightarrow b+W (-\rightarrow l+\nu)$

6事象観測
バックグラウンド 4.3
(Z 1.8 W 0.9 tt 0.9)

今のところ、超過はない

グルイーノが出来て
ニュートラリーノとクォーク
に崩壊したとして制限

スカラークォーク
が重いと自然な
壊れ方

グルイーノ > 1.5TeV
(neut_1 < 800GeV)

スクォーク~グルイーノ
> 1.8TeV

「Naturalness」に基づく
「軽い(<1TeV)超対称性」
危機的な状況

どこらへんまで、探せるか？ グルイーノ

gluino upto ~ 2.5 ~ 3TeV TeV

何故 超対称性は軽いのか？
信仰の記：

- 1) Naturalness (Stop/Higgsino)
- 2) DM (nu1)
- 3) GUT (Gaugino)

HL-LHCは gluino探索領域を10-20%伸ばす

SUSY粒子が発見されたら質量測定にHL-LHCは重要な役割を果たす。

どこらへんまで、探せるか？ 電弱ゲージノ

現在はあんまり制限がついていない

重い

HL-LHCでの
発見ってポイント
電弱ゲージノ
一番役にたつ

3) ヒッグス結合の精密測定

ATLAS+CMS Coupling Paper

- 1) Z/W Yukawaも精度 a few %
- 2) 第2世代 μ も
- 3) HHHはたぶん駄目

現在： 質量の起源 精度(5-20%)

HL-LHC
 の目玉だけど、たいへんな仕事

ここに付加価値を
 つけることが、ILC500の鍵

ATLAS Simulation Preliminary

$\sqrt{s} = 14 \text{ TeV}$: $\int L dt = 300 \text{ fb}^{-1}$; $\int L dt = 3000 \text{ fb}^{-1}$

長期計画

最重要研究期間(発見) →

最重要研究期間(発見+精密測定) →

HL-LHC加速器 建設・試運転 →

HL ATLAS/CMS検出器 建設・立ち上げ →

「人」って観点から
いうと、このあたりが
ユニーク

まとめ

人材と言う観点:

- * HL-LHC や 欧州の将来計画(広い意味でのFCC)とどう折り合いをつけていくか?
- * 大学院: 博士課程のキャリアパス

Physics Strategy (何を狙うのか)をよく考えないと、オブソリートなstrategyになったら、誰も来てくれない。

トップの人材: CERNの人材育成

明確な日本のストラテジー