

国際リニアコライダー（ILC）に関する有識者会議  
素粒子原子核物理作業部会報告

当作業部会は、平成 26 年 6 月以降 8 回にわたり、国際リニアコライダー（ILC）計画の目指す研究内容と、その内容が巨額の投資に見合った科学的意義を有するかについて検証・議論し、平成 27 年 3 月に報告をまとめた（以下、「前回報告」という）。同報告を踏まえて、国際リニアコライダー（ILC）に関する有識者会議（以下、「有識者会議」という）は、平成 27 年 6 月に「これまでの議論のまとめ」を公表した。その際は、ILC は衝突エネルギー 500GeV (GeV=10 億電子ボルト<sup>1</sup>) の電子・陽電子衝突型加速器と想定して議論を行った。

その後、ILC に関する国際的な研究者組織の一つであるリニアコライダー・コラボレーション（以下、「LCC」という）でまとめられた ILC 計画の見直し案<sup>2</sup>が、リニアコライダー国際推進委員会（以下、「LCB」という）における審議<sup>3</sup>を経て、国際将来加速器委員会（以下、「ICFA」という）において承認<sup>4</sup>され、平成 29 年 11 月に公表された。この見直しにおいては、2017 年までの 13TeV LHC 実験の結果を踏まえた上で建設に必要なコストを引き下げることも考慮して、ILC 計画は衝突エネルギーを 500GeV から 250GeV とする提案（以下、「250GeV ILC」という）に変更された。この公表を受けて平成 29 年 12 月に開催された有識者会議において、250GeV ILC の科学的意義について検証し、留意すべき点について専門的見地から検討を行うため、当作業部会が再度設置された。今回の当作業部会では、特に前回報告において最新の知見を踏まえて再度検証が必要となった部分について、平成 30 年 1 月以降 5 回にわたり議論し、検証を行った。本報告は、その結果について示すものである。

### 1. 欧州合同原子核研究機関（CERN）における実験結果について

- 前回報告及び「これまでの議論のまとめ」においては、ILC の性能、得られる成果等については、欧州合同原子核研究機関（以下、「CERN」という）が設置する大型ハドロン衝突型加速器（以下、「LHC」という）におけるエネルギー増強後の 13TeV LHC によるⅡ期実験の結果に基づき見極めることが必要とされている。
- LHC の実験スケジュールについて、13TeV によるⅡ期実験は当初 2015 年から 2017 年とされてきたが、その後 2018 年まで延長されている。当作業部会において 2017 年末までの LHC における実験結果を確認したところ、ヒッグス粒子の発見以降様々な成果はある

<sup>1</sup> 電子ボルト(eV)：エネルギーの単位。電子ひとつが 1 ボルトの電圧で加速されたときに得るエネルギーの量。

<sup>2</sup> 「Physics Case for the 250 GeV Stage of the International Linear Collider」(LCC Physics Working Group / October, 2017), 「The International Linear Collider Machine Staging Report 2017」(Linear Collider Collaboration / October, 2017)

<sup>3</sup> 「Conclusions on the 250 GeV ILC as a Higgs Factory proposed by the Japanese HEP community」(Linear Collider Board, 8 November 2017, Rev 1)

<sup>4</sup> 「ICFA Statement on the ILC Operating at 250 GeV as a Higgs Boson Factory」(Ottawa, November 2017)

るもの、標準理論を超える新粒子（強い相互作用をする超対称性粒子の可能性がある粒子）・新現象（暗黒物質や余剰次元）の兆候は捉えられていない。

- さらに、これまでの実験結果から、LHCにおいて、Ⅱ期実験が続く2018年末までに新粒子や新現象が観測される可能性は低いことが判明しており、前回報告において示されている以下のシナリオについては、(1) (2) は該当せず、(3) 13TeV LHC で新粒子や新現象が観測されない場合となった。その結果を踏まえて、国際研究者コミュニティは、ヒッグス粒子の精密測定の重要性から、ILCは当初計画の500GeVから衝突エネルギーを下げる250GeVでヒッグスファクトリーとして運転を行うように見直したことから、その内容については修正を要する。(→3.)

#### 前回報告 6. (1) ~ (3) 【抜粋】

##### 6. 13TeV LHC の成果を踏まえた ILC 等のシナリオ

13TeV LHC での成果を踏まえたシナリオに応じ ILC 計画で実施する場合の今後の戦略方針は以下のとおり。

(1) 13TeV LHC で新粒子（強い相互作用をする超対称性粒子の可能性がある粒子）が発見された場合

方針：ILC により、ヒッグス粒子やトップクォークの精密測定から、新粒子の背後にいる物理現象を解明する。LHC において、強い相互作用をする新粒子が割合軽い<sup>5</sup>場合や 250GeV 以下の質量をもつ新粒子に崩壊しているらしいとの示唆がある場合には、ILC においてこの新粒子を発見し、詳細解明を行うことが期待される。そうでない場合は、エネルギーアップグレードがゆくゆくは必要となる。

効果：超対称性の存在の証明、あるいは複合ヒッグス粒子の確認などにつながり、大きな発見や研究の進展が期待される。ILC で新粒子が発見された場合にも、大きな研究の進展が期待される。

<sup>5</sup> ILC で発見される可能性がある最も軽い新粒子の質量は、典型的な超対称性理論では強い相互作用をする超対称性粒子の概ね 1/7 以下とされている。ただし、理論的には不定性が大きいという意見もあることに留意が必要。

(2) 上記以外の新現象（暗黒物質や余剰次元）と思われる事象の兆候が観測（発見）された場合

方針：LHC で発見された新現象の性質を ILC で精査し、ヒッグス粒子やトップクォークの精密測定とあわせて、標準理論を超える物理を研究する。

効果：暗黒物質の初観測や余剰次元の探索の足がかりの観測により、大きな発見と研究の進展が期待される。

(3) 13TeV LHC で新粒子や新現象が観測されない場合

方針：ヒッグス粒子やトップクォークの精密測定から標準理論を超える物理（超対称性理論、複合ヒッグス理論等）を探索する。また ILC は LHC では検出が困難なタイプの新粒子にも感度があるため、これらの新粒子の探索も行う。LHC で未発見の原因を精査し、ILC で発見できる新粒子を探索するとともに、将来のエネルギーアップグレードの必要性を検討する。

効果：標準理論からのズレが観測された場合は、そのズレの大きさとパターンから、標準理論を超える物理の方向性と関連する新物理のエネルギー・スケールが明らかになる。新粒子が発見された場合にも、大きな研究の進展が期待される。

## 2. 250GeV ILC の科学的意義について

○ 国際研究者コミュニティにおいて、ILC 計画の衝突エネルギーを 500GeV から 250GeV に下げる見直しが行われた。これにより、加速器の建設コストを引き下げ、ILC 計画の目標について焦点を絞ったものにすることができる、と報告されている。

○ 前回報告においては、ILC の目指す科学的意義を以下のとおり整理していた。

- (1) ヒッグス粒子やトップクォークの詳細研究によるヒッグス機構の全容解明で標準理論を超える物理を探索
- (2) 超対称性粒子などの新物理の探索、及び発見された場合その詳細研究<sup>6</sup>
- (3) その他（暗黒物質や余剰次元）

○ (1) について、250GeV ILC による実験が最も優位性を有するのは、ヒッグス粒子

<sup>6</sup> LHC で新たな物理が発見される場合、それが ILC のエネルギー範囲や測定精度でどの程度まで解明し得るか等の点にも留意が必要。

と素粒子の結合定数の精密測定である。ヒッグス粒子は現在知られている強い相互作用及び電弱相互作用による力を感じない新粒子とも結合し得る性質があり、暗黒物質や通常の実験では検出不可能な粒子とも相互作用すると考えられる。結合定数を高い精度で測定し、標準理論からズレのパターンが見いだされれば、新しい物理の性質に関する情報が得られる。その結果が、今後の素粒子物理学が進む方向性に示唆を与える可能性がある。例えば、暗黒物質の正体やヒッグス粒子が真の素粒子か複合粒子であるかどうかなど、現在の標準理論では説明が困難な課題に対し、ヒッグス粒子の結合定数の精密測定が、その解明の端緒を与える可能性がある。

- また、衝突エネルギー250GeV でヒッグス粒子の生成断面積が最大化されることに加え、13TeV LHC で新粒子の兆候が観測されず 250GeV ILC でのヒッグス粒子の精密測定に有効場理論が利用できることが明らかになった<sup>7</sup>ことから、ヒッグス粒子の精密測定の実現可能性がより明確になった。
- 一方、500GeV ILC から 250GeV ILC へと衝突エネルギーを下げたことにより、前回報告において、ILC 計画における重要な課題の一つとして挙げていたヒッグス粒子の三点結合（一つのヒッグス粒子から二つのヒッグス粒子ができる反応）の測定は、250GeV ILC ではできなくなる<sup>8</sup>。また、トップクォークの精密測定についても、衝突エネルギー 350GeV が必要であることから、250GeV ILC では実験が不可能となる<sup>9</sup>。
- (2) については、前述の 2017 年末までの LHC における実験結果から、強い相互作用をする超対称性粒子については 1.5TeV~2TeV 以下に存在する可能性が極めて低いと考えられる。したがって、強い相互作用をする超対称性粒子としない超対称性粒子の理論的な対応から、LHC では探索が困難なため ILC で直接測定することが期待されていた、強い相互作用をしない超対称性粒子<sup>10</sup>については、当初計画の 500GeV ILC で発見できる可能性は低く、見直し後の 250GeV ILC では更に低い。
- 一般に電子・陽電子衝突実験は LHC に代表される陽子・陽子衝突実験では検出が困

---

<sup>7</sup> 結合定数の精密測定に必要なヒッグス粒子の全崩壊幅の決定は、250GeV ILC では困難と考えられていたが、新粒子が直接生成されないエネルギー領域では、全崩壊幅の決定に有効場理論に基づく近似計算が十分な精度で適用できることが判明した。

<sup>8</sup> 仮に三点結合定数の標準理論からのズレが予想を超えて大きい場合は、250GeV ILC でヒッグス粒子と Z 粒子等との結合定数の精密測定により、その効果が観測される可能性がある。

<sup>9</sup> LHC の将来計画である HL-LHC におけるトップクォークの質量測定精度は標準理論における真空の安定性の検証が可能なまでに向上すると考えられるため、ILC において衝突エネルギーを 350GeV にまで上げてトップクォークの質量を精密に測定する物理的な意義は下がる。

<sup>10</sup> LHC で発見された新粒子が強い相互作用をする超対称性粒子の場合、ILC で発見される可能性がある最も軽い新粒子の質量は、典型的な超対称性理論では強い相互作用をする超対称性粒子の概ね 1/7 以下とされている。ただし、理論的には不定性が大きいという意見もあることに留意が必要。

難なタイプの新粒子にも感度があるが、新粒子が 250GeV ILC で直接生成される可能性は低いため、主にヒッグス粒子の結合定数の精密測定や輻射補正<sup>11</sup>の測定等の間接的な方法を用いて探索する。

- (3) については、ヒッグス粒子のインビジブル崩壊や一光子事象、標準理論粒子の対生成における輻射補正等を測定することで暗黒物質や余剩次元等の存在を見極める間接的な方法<sup>12</sup>をとるので、250GeV ILCにおいてもその意義は余り下がらない。

### 3. 13TeV LHC の結果を踏まえた 250GeV ILC のシナリオ及び留意点

- 科学的意義の観点から、13TeV LHC の結果を踏まえた 250GeV ILC のシナリオは以下のとおり。

#### 13TeV LHC の結果を踏まえた 250GeV ILC のシナリオ（科学的意義の観点）

方針：ヒッグス粒子と他の素粒子の結合定数を精密測定し、標準理論を超える物理の解明の端緒となる事象を探査する。また、主に間接的な方法による暗黒物質や余剩次元等の探索も行う。

効果：ヒッグス粒子と他の素粒子との結合定数の精密測定において、標準理論からのズレが観測された場合は、そのズレの素粒子ごとの大きさとパターンから、標準理論を超える物理の方向性とそのエネルギー規模が明らかになる。  
また、暗黒物質や余剩次元等が観測された場合も研究の大きな進展が期待される。

- 他方、13TeV LHC の結果から、ILC では新粒子の直接探索による発見の可能性は低い。更に 500GeV ILC から 250GeV ILC への見直しにより、トップクォークの精密測定は実施できないことに留意する必要がある。
- 上記シナリオの妥当性については、技術設計報告書（TDR）検証作業部会において示される 250GeV ILC のコスト見積り等も併せて検討されるべきものである。

<sup>11</sup> 量子力学の不確定性原理によると、非常に短い時間内では高いエネルギー状態になることができるため、まれにしか起こらない超高エネルギー状態を経由する崩壊を観測することにより、重い粒子の影響を低いエネルギーでも調べることができる。

<sup>12</sup> 電子・陽電子衝突では衝突のエネルギーが正確に決まっているため、暗黒物質や余剩次元に関連する粒子に関しては、生成された側と反対側に放出された粒子を計測することで欠損エネルギーと欠損運動量を算出する等の方法により、その粒子の質量を決めることができる場合がある。

# LHCの13TeV運転の成果に応じた500GeV ILCのビジョン

## 別添1

13TeV LHCの実験結果による変化		ILCの科学的意義		ILCの国際的な求心力		備考
		上がる	下がる	上がる	下がる	
13TeV LHCでの実験結果を踏まえた 500GeV ILCでの研究の科学的意義 及び国際的な求心力の変化	1. ヒッグス粒子やトップクオーケークの精密測定から標準理論を超える物理の探索					LHCで発見がある場合、精密測定で如何なる物理かを特定する必要があり、標準理論からのズレが見えないリスクも下がるため、意義は変わらない、または更に高まるとの両論がある。求心力はLHCと2分。
	LHCで新粒子の発見があった場合					LHCで発見がない場合、LHCしか他に手段がないとして、科学的意義は更に高まる、または変わらないとの両論がある。LHCへの求心力が低下した場合は、標準理論を超える物理へのアプローチで、ILCでの精密測定に対する求心力が高まる。
	LHCで新粒子の発見がない場合					
	2. 対称性粒子などの標準理論を超える新物理による新物理の研究					ILCで見える可能性が低い場合は、エネルギーアップグレードが必要となる。エネルギーアップグレードによって新粒子が直接見える可能性が高い場合は、ILCが一定程度の求心力を有するとの意見もある。
	LHCで新粒子の発見があつたが、対応する新粒子が ILCで直接見える可能性が低い場合					
	LHCで新粒子の発見があり、対応する新粒子が ILCで直接見える可能性が高い場合					
	LHCで新粒子の発見がない場合					
	ILCで発見された新粒子が強い相互作用をする超対称性粒子の場合、ILCで発見される可能性がある最も軽い新粒子の質量は、典型的な超対称性理論では強い相互作用をする超対称性粒子の概ね1/7以下とされている。ただし、理論的には不定性が大きいという意見もあることに留意が必要。					(1)LHCで発見された新粒子が強い相互作用をする超対称性粒子の質量は、典型的な超対称性理論では強い相互作用をする超対称性粒子の概ね1/7以下とされている。ただし、理論的には不定性が大きいという意見もあることに留意が必要。
	ILCでの実験の結果、1 TeV以下の実験結果は、2 TeV (2000 GeV)。500 GeV ILCで直接探索可能な新粒子の質量の上限は250 GeV。(8TeV LHCでの実験の結果、1 TeV以下では強い相互作用をする新粒子の発見なし。)					(2)LHCで探索可能な新粒子の質量の上限は250 GeV。(8TeV LHCでの実験の結果、1 TeV以下では強い相互作用をする新粒子の発見なし。)

## 500GeV ILC(当初計画)と250GeV ILC(見直し後)の科学的意義の比較

### 別添2

500GeV ILC(当初計画)で 期待されていた成果 〔前回報告書とりまとめ(2015年3月)時点〕		LHCの13TeV運転の結果を踏まえて 250GeV ILC(見直し後)に期待される成果 備考	
解明される物理 (ILCにおける重要度順)	実験における観測量	探索・検証の 可能性	科学的意義の変化 (科学的意義の変化の理由)
	(参考) 500GeV	250 GeV	
(1) ヒッグス粒子精密 測定による新たな 物理の探索	ヒッグス粒子結合定数の 測定 ・クオーレーク(トツプ以外) ・荷電レプトン ・ゲージボソン	可能 	<p>・LHC実験の結果、標準理論を超える物理を探る手段として、ILCにおけるヒッグス粒子の精密測定の科学的意義は高まった。</p> <p>・ヒッグス粒子の精密測定により、標準理論を超える新物理の探索が可能であり、250GeVでヒッグス粒子の生成断面積が最大になる。</p> <p>・結合定数の精密測定に必要なヒッグス粒子の全崩壊幅は、新粒子が直接生成されないエネルギー領域では、有効場理論を用いて決定できることが判明した。</p> <p>・ヒッグス粒子の三点結合の測定は250GeVでは不可能だが、仮に三点結合定数の標準理論からズレが大きい場合は、ヒッグス粒子と粒子等との結合定数の精密測定により、その効果が観測される可能性がある。</p>
(2) 新粒子直接探索	超対称性粒子探索 拡張ヒッグス粒子探索	可能性 低い 	<p>・LHC13TeVでの探索で新粒子が発見されなかつたことから、理論的にに対応する新粒子がILCで発見される可能性が低くなった。</p>
(3) 間接的方法による 暗黒物質や余剰 次元等の探索	モノジェット、一光子放出 事象等のエネルギー・質量欠損事象	可能 	<p>・ヒッグス粒子のインビジブル崩壊や一光子事象、標準理論粒子の対生成における輻射補正の測定等の間接的な方法で暗黒物質や余剰次元等の探索が可能である。</p>
(4) 標準理論における 真空安定性の検証	トップクオーク質量精密 測定	可能 	<p>・トップクオークの質量をILCで精密に測定するためには、350GeV以上のエネルギーが必要であるが、LHC実験でのトップクオーク質量の最終的な測定精度は、標準理論の真空安定性の検証が可能な程度に向上するところであるので、ILCでのトップクオークの質量測定の物理的意義は下がる。</p>