

## 第2部 日本食品標準成分表2015年版(七訂)追補2017年 アミノ酸成分表編

### 第1章 説明

#### 1 アミノ酸成分表の目的及び性格

##### 1) 目的

たんぱく質はアミノ酸の重合体であり、体組織や酵素、ホルモン等の材料となるほか、栄養素及びエネルギー源としても不可欠な物質である。たんぱく質の栄養価は主に構成アミノ酸の種類と量(組成)によって決まるため、その摂取に当たっては、アミノ酸の総摂取量(たんぱく質摂取量)のほか、不可欠アミノ酸推定平均必要量を摂取することやアミノ酸組成のバランスが重要となる。

このため、食品のたんぱく質の質的評価に活用できる基礎資料としてアミノ酸成分表を作成し、国民が日常摂取する食品のたんぱく質含有量とともに、アミノ酸組成を取りまとめた。

このようにアミノ酸成分表は、国民の健康の維持増進はもとより、食料政策の検討や、研究・教育分野等に活用できる基礎資料として、関係方面での幅広い利用に供することを目的としている。

##### 2) 性格

アミノ酸成分表は、我が国において常用される重要な食品についてアミノ酸の標準的な成分値(組成)を収載している。

アミノ酸の成分値は、原材料である動植物や菌類の種類、品種、生育環境、加工方法等の諸種の要因により変動することが知られている。アミノ酸成分表の収載値は、アミノ酸成分値の変動要因を十分考慮しながら、日常、市場で入手し得る試料の分析値を基に、年間を通して普通に摂取する場合の全国的な平均値と考えられる成分値を決定し、1食品1標準成分値を原則として収載している。

##### 3) 経緯

アミノ酸成分表は、文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会の前身である科学技術庁資源調査会が、昭和41(1966)年に日本食品アミノ酸組成表として初めて策定し、公表した。その後、食生活の多様化、分析技術の向上等を背景に、四訂日本食品標準成分表のフォローアップの一環として抜本的な改正が行われ、昭和61(1986)年に改訂日本食品アミノ酸組成表(以下「改訂アミノ酸組成表」という)として公表した。

平成22(2010)年12月に、文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会は、日本食品標準成分表2010の策定に合わせて、日本食品標準成分表準拠アミノ酸成分表2010(以下「アミノ酸成分表2010」という)を取りまとめ公表した。

さらに、同資源調査分科会は、食品成分委員会を設置し、近年の食生活の変化等を考慮

しつつアミノ酸組成に関する情報の充実に努めてきた。その成果として、平成 27（2015）年 12 月の日本食品標準成分表 2015 年版（七訂）（以下「成分表 2015 年版（七訂）」という）の改訂に合わせて、日本食品標準成分表 2015 年版（七訂）アミノ酸成分表編（以下「アミノ酸成分表 2015 年版」という）を取りまとめた。

日本食品標準成分表（以下「食品成分表」という）は、近年、5 年おきに策定され、現在は次期改訂に向けての検討作業を行っている。一方、利用者の便宜を考え、食品の成分に関する情報を速やかに公開する観点から、次期改訂版公表までの各年に、その時点で食品成分表への収載を決定した食品について、成分表 2015 年版（七訂）を追補する食品成分表として公表することとし、平成 28 年に、日本食品標準成分表 2015 年版（七訂）追補 2016 年を策定した。また、たんぱく質、脂質及び炭水化物の組成についても、それぞれ日本食品標準成分表 2015 年版（七訂）追補 2016 年アミノ酸成分表編（以下「アミノ酸成分表追補 2016 年」という）、日本食品標準成分表 2015 年版（七訂）追補 2016 年脂肪酸成分表編及び日本食品標準成分表 2015 年版（七訂）追補 2016 年炭水化物成分表編として、同様に公表した。

平成 29 年においても、日本食品標準成分表 2015 年版（七訂）追補 2017 年（以下「追補 2017 年」という）を公表することとした。また、たんぱく質、脂質及び炭水化物の組成についても、それぞれ日本食品標準成分表 2015 年版（七訂）追補 2017 年アミノ酸成分表編（以下「アミノ酸成分表追補 2017 年」という）、日本食品標準成分表 2015 年版（七訂）追補 2017 年脂肪酸成分表編及び日本食品標準成分表 2015 年版（七訂）追補 2017 年炭水化物成分表編として、同様に公表することとした。

この沿革については、表 1 に示すとおりである。

表 1 アミノ酸成分表の沿革

| 名称                                     | 公表年             | 食品数<br>(累計) |
|--|-----------------|-------------|
| 日本食品アミノ酸組成表                            | 昭和 41 年（1966 年） | 157         |
| 改訂日本食品アミノ酸組成表                          | 昭和 61 年（1986 年） | 295         |
| 日本食品標準成分表準拠アミノ酸成分表 2010                | 平成 22 年（2010 年） | 337         |
| 日本食品標準成分表 2015 年版（七訂）アミノ酸成分表編          | 平成 27 年（2015 年） | 1,558       |
| 日本食品標準成分表 2015 年版（七訂）追補 2016 年アミノ酸成分表編 | 平成 28 年（2016 年） | 1,586       |
| 日本食品標準成分表 2015 年版（七訂）追補 2017 年アミノ酸成分表編 | 平成 29 年（2017 年） | 1,627       |

#### 4) アミノ酸成分表 2015 年版見直しの概要

平成 22（2010）年公表のアミノ酸成分表 2010 からアミノ酸成分表 2015 年版への変更点は、収載食品が 1,221 食品増加したこと、収載された食品の食品番号、配列、食品名等について成分表 2015 年版（七訂）と整合するように見直しを行ったこと、新たに各食品に索引番号を加えたことである。また、収載食品数を増加させ利用者の便宜を図る観点から、一部の食品は原材料割合からの計算及び海外の成分表からの推計により算出した

成分値を新たに収載した。なお、成分項目は、アミノ酸成分表 2010 と同様である。

### 5) アミノ酸成分表追補 2016 年見直しの概要

アミノ酸成分表 2015 年版からアミノ酸成分表追補 2016 年の変更点は、収載食品が 28 食品（アミノ酸成分表追補 2016 年全体では、31 食品収載している）増加したことである。収載された食品の食品番号、配列、食品名等については、アミノ酸成分表 2015 年版と整合させ成分項目も同様としている。

### 6) アミノ酸成分表追補 2017 年見直しの概要

アミノ酸成分表 2015 年版及びアミノ酸成分表追補 2016 年からアミノ酸成分表追補 2017 年の変更点は、収載食品が 43 食品（アミノ酸成分表追補 2017 年全体では、109 食品収載し、2 食品を欠番としている）増加したことである。収載された食品の食品番号、配列、食品名等については、アミノ酸成分表 2015 年版と整合させ成分項目も同様としている。

## 2 アミノ酸成分表追補 2017 年

アミノ酸成分表追補 2017 年のアミノ酸の成分値は、追補 2017 年に対応した可食部 100 g 当たりの成分値（第 1 表）及び基準窒素 1 g 当たりの成分値（第 2 表）を収載した。

さらに、アミノ酸組成によるたんぱく質 1 g 当たりの成分値（第 3 表）及び（基準窒素による）たんぱく質 1 g 当たりの成分値（第 4 表）を作表し、アミノ酸成分表追補 2017 年（報告書）収載の 2 表を加えた 4 表を文部科学省のウェブサイトで公表している。なお、基準窒素とは、たんぱく質に由来する窒素量に近づけるために、全窒素量から、野菜類は硝酸態窒素量を差し引いて求めたものである。したがって、硝酸態窒素を含まない食品では、全窒素量と基準窒素量とは同じ値になる。アミノ酸は、アミノ酸残基の量としてではなく、アミノ酸の量として収載した。

アミノ酸は、食品の可食部を分析試料として秤取り、加水分解等の処理をした後に、アミノ酸分析計等で測定し、可食部 100 g 当たりの含量として、たんぱく質の含量と共に報告される。アミノ酸成分表の作表手順は、まず各アミノ酸が分析値の場合には、必要に応じ、分析した試料のたんぱく質量を収載たんぱく質量に補正した上で、推計値の場合には、利用できる情報を活用し、計算等により、収載たんぱく質量に合わせた上で、「可食部 100 g 当たりのアミノ酸成分表」（第 1 表）を決定した。

第 2 表の「基準窒素 1 g 当たりのアミノ酸成分表」は、第 1 表の成分値を、追補 2017 年に収載されたたんぱく質量を求める際に利用した基準窒素量（必要に応じ補正した値）で除して作成した。

第 3 表の「アミノ酸組成によるたんぱく質 1 g 当たりのアミノ酸成分表」は、第 1 表の成分値を、各アミノ酸量に基づくアミノ酸の脱水縮合物（アミノ酸残基）の総量として算出したアミノ酸組成によるたんぱく質量で除して作成した。

第 4 表の「（基準窒素による）たんぱく質 1 g 当たりのアミノ酸成分表」は、第 1 表の成分値を、基準窒素量に窒素-たんぱく質換算係数を乗じて算出したたんぱく質量で除して作成した。（基準窒素による）たんぱく質は、追補 2017 年及びアミノ酸成分表追補 2017 年収載の「たんぱ

く質」と同じものである。各表の名称は下記のとおりである。

第1表 可食部 100 g 当たりのアミノ酸成分表

第2表 基準窒素 1 g 当たりのアミノ酸成分表

第3表<sup>(注)</sup> アミノ酸組成によるたんぱく質 1 g 当たりのアミノ酸成分表（ウェブサイトで公開）

第4表 (基準窒素による) たんぱく質 1 g 当たりのアミノ酸成分表（ウェブサイトで公開）

(注) 「第3表」は、アミノ酸成分表 2010 では「食品可食部のたんぱく質 1 g 当たりのアミノ酸組成表」と表記していた。

## 1) 収載食品

### (1) 食品群の分類及び配列

食品群の分類及び配列は、成分表 2015 年版（七訂）に従い、次のとおりである。

1 穀類、2 いも及びでん粉類、3 砂糖及び甘味類、4 豆類、5 種実類、6 野菜類、7 果実類、8 きのこ類、9 藻類、10 魚介類、11 肉類、12 卵類、13 乳類、14 油脂類、15 菓子類、16 し好飲料類、17 調味料及び香辛料類、18 調理加工食品類

(注) アミノ酸成分表追補 2017 年に収載した食品は、これら全ての群に含まれるとは限らない。

### (2) 収載食品の概要

収載食品は、改訂アミノ酸組成表及びアミノ酸成分表 2010 策定時において、

- ① たんぱく質供給食品として、たんぱく質含量の多い食品及び摂取量の多い食品を中心として対象とする
- ② 原材料的食品については、消費形態に近いものを対象とする
- ③ 加工食品については、日常よく摂取されるものの中から、アミノ酸組成に変化をもたらすような加工がされているものを対象とする

との考え方に基づき選定され、アミノ酸成分表 2015 年版もこの考えが踏襲されている。

アミノ酸成分表追補 2017 年の策定に際しても同様に選定しつつ、追補 2017 年との整合性を確保した。なお、収載した食品のうち、新規収載した食品は、アミノ酸成分を分析し、分析値に基づく成分値を収載した。また、アミノ酸成分表 2015 年版において、海外（米国成分表）から成分値を推計した「はちみつ」及び「かぼちゃ いり、味付け」、「ごま いり」から成分値を推計した「ごま ねり」並びに「なめこ 生」から成分値を推計した「なめこ ゆで」については、たんぱく質の変更に伴い再計算し成分値を見直した。

この結果、アミノ酸成分表 2015 年版及びアミノ酸成分表追補 2016 年に収載した合計食品数 1,586 食品から、新たに 43 食品を追加し、2 食品を欠番としたことにより収載した食品数は 1,627 食品（第 1 表）である。食品群別収載食品は表 2 に示すとおりである。

表2 食品群別収載食品数

| 食品群          | 食品数（第1表） | 増加数 |
|--------------|----------|-----|
| 1 穀類         | 144      | 0   |
| 2 いも及びでん粉類   | 32       | 0   |
| 3 砂糖及び甘味類    | 2        | 1   |
| 4 豆類         | 82       | 0   |
| 5 種実類        | 40       | 1   |
| 6 野菜類        | 270      | 2   |
| 7 果実類        | 105      | 0   |
| 8 きのこ類       | 46       | 1   |
| 9 藻類         | 36       | 0   |
| 10 魚介類       | 332      | 9   |
| 11 肉類        | 248      | 15  |
| 12 卵類        | 16       | 0   |
| 13 乳類        | 53       | 2   |
| 14 油脂類       | 5        | 0   |
| 15 菓子類       | 122      | 0   |
| 16 し好飲料類     | 9        | 1   |
| 17 調味料及び香辛料類 | 80       | 9   |
| 18 調理加工食品類   | 5        | 0   |
| 合計           | 1,627    | 41  |

### (3) 食品の名称、分類、配列、食品番号及び索引番号

食品の名称、分類、配列及び食品番号については、追補 2017 年に準じた。この番号は追補 2017 年等と共通のものであり、各成分表の収載食品数が異なることから、アミノ酸成分表追補 2017 年には現れない番号がある。なお、新規食品の索引番号は付さなかった。次期改訂においては、これらの食品も含め索引番号が付されることになる。

### (4) 収載食品の留意点

各食品群及び各食品の詳細な説明については、追補 2017 年の第 1 部第 3 章食品群別留意点を参照されたい。

## 2) 収載成分項目等

### (1) 項目及びその配列

項目の配列は、次のとおりとした。

第 1 表：水分、たんぱく質、アミノ酸組成によるたんぱく質、各アミノ酸、アミノ酸合計、アンモニア

第 2 表：各アミノ酸、アミノ酸合計、アンモニア、アミノ酸組成によるたんぱく質に対する窒素－たんぱく質換算係数

第 3 表、第 4 表：各アミノ酸、アミノ酸合計、アンモニア

(2) アミノ酸<sup>(注)</sup>

① アミノ酸は、18種（肉類、魚介類と調味料及び香辛料類は19種類）を収載した。

その内訳は、体内で合成されないか又は十分に合成されない不可欠アミノ酸（必須アミノ酸）として、イソロイシン、ロイシン、リシン（リジン）、含硫アミノ酸（メチオニン、シスチン）、芳香族アミノ酸（フェニルアラニン、チロシン）、トレオニン（スレオニン）、トリプトファン、バリン、ヒスチジン、その他のアミノ酸としてアルギニン、アラニン、アスパラギン酸、グルタミン酸、グリシン、プロリン、セリンである。このほか、魚介類等についてはヒドロキシプロリンを収載した。

アスパラギン及びグルタミンは、アミノ酸分析の前処理におけるたんぱく質の加水分解で、それぞれアスパラギン酸、グルタミン酸に変化し、測定の際には、たんぱく質中のアスパラギンとアスパラギン酸あるいはグルタミンとグルタミン酸は区別できないので、それぞれアスパラギン酸及びグルタミン酸に含めた。また、シスチンの成分値は、システインとシスチン（2分子のシステインが結合したもの）の合計で、1/2シスチン量として表した。たんぱく質を構成するアミノ酸と遊離のアミノ酸は区別していない。

収載した各アミノ酸の和名、英名、記号及び分子量は、表3のとおりである。

（注）アミノ酸の解説（114頁）を参照。

表3 収載したアミノ酸及び分子量

| 和名           | 英名            | 記号      | 分子量    |
|--------------|---------------|---------|--------|
| イソロイシン       | Isoleucine    | Ile     | 131.17 |
| ロイシン         | Leucine       | Leu     | 131.17 |
| リシン（リジン）     | Lysine        | Lys     | 146.19 |
| メチオニン        | Methionine    | Met     | 149.21 |
| シスチン         | Cystine       | Cys-Cys | 240.30 |
| 1/2シスチン      | Half-cystine  |         | 120.15 |
| フェニルアラニン     | Phenylalanine | Phe     | 165.19 |
| チロシン         | Tyrosine      | Tyr     | 181.19 |
| トレオニン（スレオニン） | Threonine     | Thr     | 119.12 |
| トリプトファン      | Tryptophan    | Trp     | 204.23 |
| バリン          | Valine        | Val     | 117.15 |
| ヒスチジン        | Histidine     | His     | 155.16 |
| アルギニン        | Arginine      | Arg     | 174.20 |
| アラニン         | Alanine       | Ala     | 89.09  |
| アスパラギン酸      | Aspartic acid | Asp     | 133.10 |
| グルタミン酸       | Glutamic acid | Glu     | 147.13 |
| グリシン         | Glycine       | Gly     | 75.07  |
| プロリン         | Proline       | Pro     | 115.13 |
| セリン          | Serine        | Ser     | 105.09 |

表3 つづき

| 和名                | 英名                            | 記号  | 分子量    |
|-------------------|-------------------------------|-----|--------|
| ヒドロキシプロリン<br>(参考) | Hydroxyproline                | Hyp | 131.13 |
| 含硫アミノ酸            | sulfur-containing amino acids | SAA | —      |
| 芳香族アミノ酸           | aromatic amino acids          | AAA | —      |

② アミノ酸の配列は、はじめに不可欠アミノ酸、次に可欠アミノ酸（非必須アミノ酸）とし、それぞれ原則として英名によるアルファベット順とした。なお、メチオニンとフェニルアラニンは、栄養的にはその一部をそれぞれシスチンとチロシンで置き替えることができるので、メチオニンの次にシスチン、フェニルアラニンの次にチロシンとした。

ヒスチジンは、大人は体内で合成できるが、子どもは合成できないので、不可欠アミノ酸であるが、他の不可欠アミノ酸とは少し異なることから、バリンの次に配列した。

また、アルギニンは、動物の種類によっては不可欠アミノ酸であったり、不可欠アミノ酸に準ずるものであったりするので、他の可欠アミノ酸と対照できるよう、不可欠アミノ酸と可欠アミノ酸の間に配列した。

さらに、メチオニン及びシスチンを含硫アミノ酸として、フェニルアラニン及びチロシンを芳香族アミノ酸として、それぞれ小計欄を設けるとともに、各アミノ酸の合計を「アミノ酸合計」として示した。

③ 各アミノ酸の測定方法の概要は表4のとおりである。

表4 アミノ酸の測定法

| 対象アミノ酸                         | 項目     | 概要   |
|--------------------------------|--------|--|
| 一般のアミノ酸★<br>ヒドロキシプロリン<br>アンモニア | 定量法    | カラムクロマトグラ法（アミノ酸自動分析計使用）  |
|                                | 加水分解条件 | 6 mol/L 塩酸（0.04% 2-メルカプトエタノール含有）<br>110 °C、24 時間               |
| シスチン<br>メチオニン                  | 定量法    | カラムクロマトグラ法（アミノ酸自動分析計使用）  |
|                                | 加水分解条件 | 過ギ酸酸化後<br>6 mol/L 塩酸<br>130～140 °C、20 時間                       |
| メチオニン★★                        | 定量法    | カラムクロマトグラ法（アミノ酸自動分析計使用）  |
|                                | 加水分解条件 | 6 mol/L 塩酸（0.1% 2-メルカプトエタノール含有）<br>窒素を吹き込みながら 130～140 °C、20 時間 |
| トリプトファン                        | 定量法    | 高速液体クロマトグラ法  |
|                                | 加水分解条件 | 水酸化バリウム（チオジエチレングリコール含有）<br>110 °C、12 時間                        |

\* イソロイシン、ロイシン、リシン（リジン）、フェニルアラニン、チロシン、トレオニン（スレオニン）、バリン、

ヒスチジン、アルギニン、アラニン、アスパラギン酸、グルタミン酸、グリシン、プロリン、セリン

★★ シスチン及びメチオニンの測定法では、メチオニンが妨害ピークの影響で分離できない場合に用いる。

### (3) 水分及びたんぱく質（基準窒素によるたんぱく質）

利用者の便宜を図る観点から、水分及びたんぱく質について追補2017年の収載値を収載した。

なお、アミノ酸成分表追補 2017 年収載の食品に係る追補 2017 年の測定方法の概要は、表 5 のとおりである。

表 5 水分及びたんぱく質の測定法

| 成分    | 測定法  |
|-------|--|
| 水分    | 常圧加熱乾燥法又は減圧加熱乾燥法<br>ただし、アルコール又は酢酸を含む食品は、乾燥減量からアルコール分又は酢酸の重量をそれぞれ差し引いて算出。   |
| たんぱく質 | 改良ケルダール法又は燃焼法（改良デュマ法）によって定量した窒素量に、「窒素ーたんぱく質換算係数」（表6）を乗じて算出。<br>野菜類はサリチル酸添加改良ケルダール法で硝酸態窒素を含む全窒素量を定量し、別に定量した硝酸態窒素を差し引いてから算出。 |

### (4) アミノ酸組成によるたんぱく質

アミノ酸組成によるたんぱく質は、アミノ酸組成に基づいて、アミノ酸の脱水縮合物の量、すなわちアミノ酸残基の総量として求めた値である。

アミノ酸組成によるたんぱく質 (g)

$$= \sum \{ \text{可食部 } 100 \text{ g 中の各アミノ酸量 (g)} \times (\text{そのアミノ酸の分子量} - 18.02) \\ / \text{そのアミノ酸の分子量} \}$$

### (5) アミノ酸組成によるたんぱく質に対する窒素換算係数

アミノ酸組成によるたんぱく質に対する窒素換算係数は、基準窒素 1 g 当たりの個々のアミノ酸残基の総量として求めた値である。

個々の食品のたんぱく質量を求める場合は、その食品の基準窒素量に当該窒素換算係数を乗じることにより、従来の方法に従い基準窒素量に従来の窒素ーたんぱく質換算係数（表 6）を乗じたたんぱく質量よりも、より正確なたんぱく質量を求めることができる。

表6 窒素－たんぱく質換算係数

| 食品群              | 食品名  | 換算係数 |
|------------------|--|------|
| 1 穀類             | アマランサス   | 5.30 |
|                  | えんぱく   |      |
|                  | オートミール <sup>1)</sup>   | 5.83 |
|                  | おおむぎ <sup>1)</sup>   | 5.83 |
|                  | こむぎ  |      |
|                  | 全粒粉 <sup>1)</sup>  | 5.83 |
|                  | 小麦粉 <sup>1)</sup> 、フランスパン、うどん・そうめん類、中華めん類、マカロニ・スペゲッティ類 <sup>1)</sup> 、ふ類、小麦たんぱく、ぎょうざの皮、しゅうまいの皮 | 5.70 |
|                  | 小麦はいが <sup>2)</sup>  | 5.80 |
|                  | こめ <sup>1)</sup> 、こめ製品（赤飯を除く）  | 5.95 |
|                  | ライ麦 <sup>1)</sup>  | 5.83 |
| 4 豆類             | だいいず <sup>1)</sup> 、だいいず製品   | 5.71 |
| 5 種実類            | アーモンド <sup>1)</sup>  | 5.18 |
|                  | ブラジルナッツ <sup>1)</sup> 、らっかせい   | 5.46 |
|                  | その他のナッツ類 <sup>1)</sup>   | 5.30 |
|                  | あまに、えごま、かぼちゃ、けし、ごま <sup>1)</sup> 、すいか、はす、ひまわり  | 5.30 |
|                  |  |      |
| 6 野菜類            | えだまめ、だいいずもやし   | 5.71 |
|                  | らっかせい（未熟豆）   | 5.46 |
| 11 肉類            | ゼラチン <sup>3)</sup> 、軟骨（ぶた）   | 5.55 |
| 13 乳類            | 液状乳類 <sup>1)</sup> 、チーズを含む乳製品、その他  | 6.38 |
| 14 油脂類           | バター類 <sup>1)</sup> 、マーガリン類 <sup>1)</sup>   | 6.38 |
| 17 調味料及び<br>香辛料類 | しょうゆ類、みそ類  | 5.71 |
|                  | 上記以外の食品  | 6.25 |

## (6) アンモニア

アンモニアは、食品中に少量含まれているものを除き、その大部分がたんぱく質の加水分解の過程で生じるものであり、グルタミンやアスパラギンに含まれるアミド基由來のものが主体であると考えられることから、アミド態のアミノ酸量の推定に有益な情報として、この値を収載した。

このアンモニア量をこれらのアミノ酸のアミド態窒素としてたんぱく質量に算入することも検討したが、現時点では、アミド基に由来するものの割合についての十分な情報がないこと及びアミド態とみなしてもたんぱく質の計算値はほぼ同一であることから、アンモニアの量を別欄に示して参考として供することとした。

なお、グルタミン酸、アスパラギン酸として定量されるアミノ酸がすべてアミド態と仮定して、そのためのアンモニアを差し引いてもなおアンモニアが残る場合、その量を備考欄に「剩余アンモニア」として示した。

この「剩余アンモニア」は、非たんぱく態の含窒素化合物に由来するものと考えられる。また、特に野菜類においては、硝酸態窒素の一部がアミノ酸の定量操作の過程でアンモニアに変換されることが認められたので、硝酸態窒素に由来するものが多いと考えられる。

#### (7) 備考欄

既に述べたもののほか、食品の別名、試料、性状、廃棄部位等を記載した。

#### 3) 数値の表示方法

数値の表示方法は、以下による（表7参照）。

表7 数値の表示方法

| 項目                 | 単位 | 最小表示の位               | 数値の丸め方                         |
|--------------------|----|----------------------|--------------------------------|
| 水分                 |    |                      |                                |
| たんぱく質              | g  | 小数第1位                | 小数第2位を四捨五入。                    |
| アミノ酸組成による<br>たんぱく質 |    |                      |                                |
| 各アミノ酸              |    | 整数表示                 | 整数表示では、大きい位から3桁目を四捨五入して有効数字2桁。 |
| アミノ酸合計             | mg | (ただし、10未満は<br>小数第1位) | 小数第1位表示では、小数第2位を四捨五入。          |
| アンモニア              |    |                      |                                |

水分、たんぱく質及びアミノ酸組成によるたんぱく質の単位はgとし、小数第1位まで表示した。

各アミノ酸、アミノ酸合計及びアンモニアの単位はmgとし、整数表示（ただし、10未満は小数第1位まで表示）とした。

数値の丸め方は、最小表示桁の一つ下の桁を四捨五入したが、整数で表示するものについては、大きい位から3桁目を四捨五入して有効数字2桁で示した。

推計値は（）を付けて収載した（推計値については、「2-1) (2) 収載食品の概要」を参照）。

#### 4) 食品の調理条件

食品の調理条件は、追補2017年と同様、一般調理（小規模調理）を想定し基本的な調理条件を定めた。

アミノ酸成分表追補2017年の加熱調理は、ゆで、水煮、焼き、油いため及びフライを収載した。また、非加熱調理は、刺身を収載した。

加熱調理の調理過程の詳細は、各食品の調理条件の概要については、追補2017年の第1部第1章表13を参照されたい。

なお、ゆでは、調理の下ごしらえとして行い、ゆで汁は廃棄する。和食の料理では伝統的

に、それぞれの野菜に応じゆでた後の処理を行っている。アミノ酸成分表追補 2017 年では、野菜類として「ほうれんそう 冷凍 ゆで」を、きのこ類としては「なめこ ゆで」を、魚介類として「たらばがに ゆで」を収載した。

水煮は、煮汁に調味料を加え、煮汁も料理の一部とする調理であるが、本成分表における分析に当たっては、煮汁に調味料を加えず、煮汁は廃棄している。アミノ酸成分表追補 2017 年では、魚介類で水煮の食品を収載した。

## 参考文献

- 1) FAO/WHO:Energy and protein requirements, Report of a Joint FAO/WHO AdHoc Expert Committee.WHO Technical Report Series. No. 522, FAO Nutrition Meetings Report Series, No.52 (1973)
- 2) FAO:Amino acid content of foods and biological data on proteins. Nutritional Studies, No. 24 (1970)
- 3) Merrill, A.L. and Watt, B.K.:Energy value of foods-basis and derivation-Agricultural Research Service United States Department of Agriculture. Agriculture Handbook. No. 74 (1955)

## 【参考】

### 解 説

#### 1 アミノ酸

アミノ酸とは、一般には、1分子中にアミノ基とカルボキシル基をもつ化合物の総称として用いられるが、アミノ酸の種類によっては、アミノ基はイミノ基である場合もあり、また、カルボキシル基でなく、スルフォノ基、ホスホノ基である場合もある。以下では、特にこれを断らず、アミノ酸、アミノ基、カルボキシル基と記述する。

アミノ酸は、自然界に遊離の形でも存在するほか、他のアミノ酸と結合してペプチドを形成している場合もある。しかし、大部分のアミノ酸は、生物のからだを構成するたんぱく質（ポリペプチド）の構成成分として存在している。

食品も、大部分は生物体やその代謝産物であるので、食品に含まれるアミノ酸も、大部分はたんぱく質を構成するアミノ酸である。

#### 2 ペプチド、たんぱく質

アミノ酸は、1分子の中に、アミノ基とカルボキシル基をもつので、あるアミノ酸のアミノ基と他のアミノ酸のカルボキシル基が脱水縮合して共有結合を形成する。この結合をペプチド結合と呼ぶ。ペプチド結合を酸やアルカリなどの存在下で加水分解するとアミノ酸を生成する。

アミノ酸2つ以上がペプチド結合で結合した化合物はペプチドと呼ばれる。2つのアミノ酸がペプチド結合で結合したペプチドをジペプチドと呼び、数にしたがってトリペプチド、テトラペプチド、ペンタペプチドなどと呼ばれるが、2から20程度のアミノ酸が結合したペプチドをオリゴペプチドと総称する<sup>(注)</sup>。さらに多数のアミノ酸が結合した物質をポリペプチドと呼ぶ。たんぱく質はポリペプチドで、天然に存在するアミノ酸の大部分は、たんぱく質の形で存在する。

(注) IUPAC&IUBMB1983、Oxford Dictionary of Biochemistry and Molecular Biology Second Edition 2006等による。

#### 3 天然に存在するアミノ酸

天然に存在する大部分の遊離アミノ酸並びにペプチド及びポリペプチド（たんぱく質）を構成するアミノ酸は、 $\alpha$ -アミノ酸で、これは、カルボキシル基と結合した炭素原子（有機化合物の命名法における2（又は $\alpha$ ）の位置の炭素原子）にアミノ基が結合しているアミノ酸である。そのほか、3（又は $\beta$ ）の位置の炭素原子にアミノ基が結合した $\beta$ -アミノ酸なども天然に存在するが、大部分のたんぱく質の構成アミノ酸ではない。以下 $\alpha$ -アミノ酸を単にアミノ酸と呼ぶ。

#### 4 たんぱく質を構成するアミノ酸

筋肉、内臓、血液、骨格、皮膚等の組織や酵素、ホルモン、免疫抗体の生理機能を維持、

調節する物質の基本的構成成分であるたんぱく質は、通常 20 種類のアミノ酸で構成されている。それらは、五十音順に、アスパラギン、アスパラギン酸、アラニン、アルギニン、イソロイシン、グリシン、グルタミン、グルタミン酸、システイン（システインは、スルフヒドリル基を持っているので、2 分子のシステインの間で酸化によりジスルフィド結合が形成される。このシステイン 2 分子で構成されるアミノ酸をシスチンという。天然のたんぱく質には、ジスルフィド結合をしているシスチンが多いが、システインも存在する）、セリン、チロシン、トリプトファン、トレオニン（スレオニン）、バリン、ヒスチジン、フェニルアラニン、プロリン、メチオニン、リシン（リジン）、ロイシンである。生体にはさまざまな種類のたんぱく質が含まれているが、特定のたんぱく質を考えると、いずれも、そのたんぱく質に特有の配列でアミノ酸がペプチド結合で結合している。

すなわち、あるたんぱく質のアミノ酸の配列は一定であり（同一種内で、ある特定のたんぱく質のアミノ酸の配列に遺伝的な違いがある場合は、遺伝的多型と呼ばれる）、これは遺伝情報として世代を超えて伝達される。

## 5 天然のアミノ酸の立体異性体

アミノ酸は、2 ( $\alpha$ ) の位置の炭素原子に水素とアミノ基が結合し、また側鎖と呼ばれる原子団が結合している。したがって、側鎖が水素であるグリシンを除いて、2 の位置の炭素原子が不斉炭素原子となるため、立体異性体が存在し、光学活性を有する。IUPAC 及び IUBMB が勧告している命名法（1983）では、アミノ酸の立体異性体は D, L で表示することができ、たんぱく質を構成するアミノ酸は、立体異性体のないグリシンを除いて、すべて L 形である。また、より一般的に、キラル中心に付いた置換基の立体配置を R, S で表示することができる。たんぱく質を構成する大部分のアミノ酸のキラル中心である 2 位不斉炭素に関しての立体配置は S で、システインのそれは R である。

アラニンを例に、2 位不斉炭素に関する共有結合を破線とくさび型で表記した構造式を末尾の図に示した。図の中心の炭素は紙面上にあり、カルボキシル基とメチル基は紙面奥にあり、アミノ基と水素は紙面手前にあることを示している。

イソロイシン及びトレオニンは、3 ( $\beta$ ) 位にもう一つの不斉炭素原子をもっているので、その不斉炭素原子についても立体異性体が存在する。

## 6 アミノ酸の表示

アミノ酸は、一般に慣用名が広く使用されており、系統名が使われる場合は少ない。記号として 3 文字記号が用いられるが、生化学の分野では、たんぱく質やペプチドのアミノ酸配列を示す場合に、1 文字記号が広く使用されている。末尾の表 8 を参照されたい。

## 7 アミノ酸の側鎖

アミノ酸の化学的性質の違いは側鎖によって決まる。側鎖の性質によってアミノ酸が分類されることがある。

分枝（分岐鎖）アミノ酸（側鎖のアルキル基に分枝があるもの）

イソロイシン、ロイシン、バリン

酸性アミノ酸（側鎖にカルボキシル基があり、溶液とした際に酸性を示すもの）

アスパラギン酸、グルタミン酸

中性アミノ酸（溶液とした際にほぼ中性を示すもの）

アスパラギン、アラニン、イソロイシン、グリシン、グルタミン、システイン、セリン、チロシン、トレオニン（スレオニン）、フェニルアラニン、プロリン、バリン、メチオニン、ロイシン、トリプトファン

塩基性アミノ酸（溶液とした際に塩基性を示すもの）

アルギニン、ヒスチジン、リシン（リジン）

含硫アミノ酸（側鎖に硫黄があるもの）

システイン、メチオニン

芳香族アミノ酸（側鎖にベンゼン核をもつもの）

チロシン、トリプトファン、フェニルアラニン

ヒドロキシアミノ酸（側鎖にヒドロキシル基があるもの）

トレオニン（スレオニン）、セリン、チロシン、ヒドロキシプロリン

酸アミドアミノ酸（側鎖が酸アミドになっているもの）

アスパラギン、グルタミン

## 8 不可欠アミノ酸（必須アミノ酸）

アミノ酸には、体内で合成できるアミノ酸と合成できないアミノ酸がある。後者を不可欠アミノ酸又は必須アミノ酸といい、これらのアミノ酸は、食事から摂取しなければならない。ヒトでは9種類が不可欠アミノ酸である。すなわち、イソロイシン、トリプトファン、トレオニン（スレオニン）、バリン、ヒスチジン、フェニルアラニン、メチオニン、リシン（リジン）及びロイシンである。

不可欠アミノ酸以外のアミノ酸は、可欠アミノ酸又は非必須アミノ酸といい、体内で合成できるアミノ酸である。体内で合成できるが、生理的条件、遺伝的要因などによって、身体が必要とする量に見合う量を合成できないアミノ酸がある。これらを条件付き不可欠アミノ酸（条件付き必須アミノ酸）ということがある。アルギニン、システイン（シスチン）、チロシンなどは、条件付き不可欠アミノ酸である。

なお、食事摂取基準（厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2015年版）」）に、日本人のための不可欠アミノ酸の推定平均必要量が示されているので参考されたい。

## 9 アミノ酸の分析

食品中のアミノ酸は、遊離の状態でも存在するが、大部分がたんぱく質を構成するアミノ酸（アミノ酸残基）として存在する。このため、食品中のアミノ酸量を知るためには、たんぱく質やペプチドを加水分解して、遊離のアミノ酸にして分析する必要がある。たんぱく質やペプチドを加水分解する際のアミノ酸の安定性や分解性はアミノ酸の種類により異なる。大部分のアミノ酸は、酸による加水分解条件下で安定しているため、酸により加水分解する。しかし、トリプトファンは、酸による加水分解では分解するため、アルカリにより加水分解する。システインは、酸による加水分解では一部が破壊されるため、あらかじめ酸化させて、システイン

酸としてから、加水分解する。メチオニンも酸化させ、メチオニンスルホンとしてから、加水分解する。

酸アミドであるグルタミン及びアスパラギンは、加水分解により、それぞれグルタミン酸及びアスパラギン酸に変化する。このため、アミノ酸成分表では、グルタミン由来のグルタミン酸と元から存在するグルタミン酸の合計量をグルタミン酸として、アスパラギン由来のアスパラギン酸と元から存在するアスパラギン酸の合計量をアスパラギン酸として示した。

## 10 たんぱく質の栄養価の評価

FAO/WHO 等は、食事のたんぱく質に含まれるべき不可欠アミノ酸の組成 (mg/g たんぱく質) を、標準となるアミノ酸評点パターン (Requirement pattern) として公表している。このアミノ酸評点パターンと食品のたんぱく質中のアミノ酸量を比較することで、たんぱく質の栄養価を評価できる。たんぱく質中のアミノ酸量のうち、アミノ酸評点パターンを下回るものを制限アミノ酸という。アミノ酸スコアは、たんぱく質 1 g 中の第一制限アミノ酸の量 (mg) を評点パターンにおけるそのアミノ酸の量 (mg) で除した値に 100 を乗じたものである。

食事摂取基準の策定に際しては、国民・健康栄養調査の結果における食品群別たんぱく質摂取量とそれぞれのたんぱく質のアミノ酸組成からアミノ酸摂取量を算出して、摂取したたんぱく質 (平均) のアミノ酸スコアを求めている。そして、1973 年 FAO/WHO アミノ酸評点パターン、1985 年 FAO/WHO/UNU アミノ酸評点パターン及び 2007 年 FAO/WHO/UNU アミノ酸評点パターンのいずれを基準にしても、アミノ酸スコアが 100 を超えていたため、食事から良質なたんぱく質を摂取しているとみなしている。

## 11 アミノ酸成分表について

アミノ酸成分表と、食事調査等の結果を組み合わせれば、アミノ酸の摂取量が算出できる。アミノ酸の摂取量は、個別や集団の食事及び栄養状況の把握や評価に活用できる。特に、アミノ酸の摂取量に配慮する食事を提供する場合には、アミノ酸成分表の活用は必須である。

現在、不可欠アミノ酸の食事摂取基準は策定されていないが、推定平均必要量が「たんぱく質必要量 (g/kg 体重/日) に対するアミノ酸必要量 (mg/kg 体重/日)」として示されている。そこで、アミノ酸成分表を活用すると、不可欠アミノ酸必要量に対する摂取量の評価、不足を補う献立作成や栄養アドバイスなどを行うことができる。

表8 たんぱく質を構成するアミノ酸の慣用名、記号及び系統名 (\*は不可欠アミノ酸)

| 慣用名               |               | 3文字<br>記号 | 1文字<br>記号 | 系統名  |
|-------------------|---------------|-----------|-----------|--|
| イソロイシン*           | Isoleucine    | Ile       | I         | 2-Amino-3-methylpentanoic acid<br>2-アミノ-3-メチルペプチド酸   |
| ロイシン*             | Leucine       | Leu       | L         | 2-Amino-4-methylpentanoic acid<br>2-アミノ-4-メチルペプチド酸   |
| リシン(リジン)*         | Lysine        | Lys       | K         | 2,6-Diaminohexanoic acid<br>2,6-ジアミノヘキサン酸  |
| メチオニン*            | Methionine    | Met       | M         | 2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid<br>2-アミノ-4-(メチルチオ)ブタノン酸                                    |
| システイン             | Cysteine      | Cys       | C         | 2-Amino-3-mercaptopropanoic acid<br>2-アミノ-3-メルカプトプロパン酸   |
| フェニルアラニン*         | Phenylalanine | Phe       | F         | 2-Amino-3-phenylpropanoic acid<br>2-アミノ-3-フェニルプロパン酸  |
| チロシン              | Tyrosine      | Tyr       | Y         | 2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl) propanoic acid<br>2-アミノ-3-(4-ヒドロキシフェニル)プロパン酸                       |
| トレオニン*<br>(スレオニン) | Threonine     | Thr       | T         | 2-Amino-3-hydroxybutanoic acid<br>2-アミノ-3-ヒドロキシブタノン酸   |
| トリプトファン*          | Tryptophan    | Trp       | W         | 2-Amino-3-(1 <i>H</i> -indol-3-yl)-propanoic acid<br>2-アミノ-3-(1 <i>H</i> -インドル-3-イル)-プロパン酸     |
| バリン*              | Valine        | Val       | V         | 2-Amino-3-methylbutanoic acid<br>2-アミノ-3-メチルブタノン酸  |
| ヒスチジン*            | Histidine     | His       | H         | 2-Amino-3-(1 <i>H</i> -imidazol-4-yl)-propanoic acid<br>2-アミノ-3-(1 <i>H</i> -イミダゾル-4-イル)-プロパン酸 |
| アルギニン             | Arginine      | Arg       | R         | 2-Amino-5-guanidinopentanoic acid<br>2-アミノ-5-グアニジノペプチド酸  |
| アラニン              | Alanine       | Ala       | A         | 2-Aminopropanoic acid<br>2-アミノプロパン酸  |
| アスパラギン酸           | Aspartic acid | Asp       | D         | 2-Aminobutanedioic acid<br>2-アミノブタジオノン酸  |
| アスパラギン            | Asparagine    | Asn       | N         | 2-Amino-3-carbamoylpropanoic acid<br>2-アミノ-3-カルバモイルプロパン酸                                       |
| グルタミン酸            | Glutamic acid | Glu       | E         | 2-Aminopentanedioic acid<br>2-アミノペプチド酸   |
| グルタミン             | Glutamine     | Gln       | Q         | 2-Amino-4-carbamoylbutanoic acid<br>2-アミノ-4-カルバモイルブタノン酸  |

表8 続き

| 慣用名       |                | 3 文字<br>記号 | 1 文字<br>記号 | 系統名  |
|-----------|----------------|------------|------------|--|
| グリシン      | Glycine        | Gly        | G          | Aminoethanoic acid<br>アミノエタン酸                                  |
| プロリン      | Proline        | Pro        | P          | Pyrrolidine-2-carboxylic acid<br>ピロリジン-2-カルボン酸                 |
| セリン       | Serine         | Ser        | S          | 2-Amino-3-hydroxypropanoic acid<br>2-アミノ-3-ヒドロキシプロパン酸          |
| ヒドロキシプロリン | Hydroxyproline | Hyp        | -          | 4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid<br>4-ヒドロキシピロリジン-2-カルボン酸 |

<sup>1)</sup> International Union of Pure and Applied Chemistry and International Union of Biochemistry and Molecular Biology - IUPAC-IUB Joint Commission on Biochemical Nomenclature (JCBN) : Nomenclature and Symbolism for Amino Acids and Peptides (Recommendations 1983) (<http://www.chem.qmul.ac.uk/iupac/AminoAcid/>, World Wide Web version prepared by G. P. Moss.)

<sup>2)</sup> ヒドロキシプロリンには、3位に水酸基が付いた異性体も存在するが、その量は少ない。




図 アラニンの立体異性体