

呕吐处理步骤


准备物品



桶



塑料袋



纸巾



消毒液



稀释用的瓶子


- 将消毒液、一次性手套等处理时需用的物品都放在桶里备齐。
- 将处理步骤的备忘录也放入其中，确保教职人员全员知晓。

服装

一次性口罩

防护服或围裙
(塑料制)

一次性手套
叠用2枚



根据需要佩戴护目镜或面罩

消毒液

- 使用 0.1% 的次氯酸钠。(酒精是没有效果的)
- 直接使用原液可能产生有毒气体，因此**必须用水稀释后使用**。(不同产品浓度不同，要确认标识)

注意事项

- 稀释后的消毒液不要提前准备。要保管原液。
- 为了防止孩子误饮，请在容器上写明这是消毒液。

呕吐处理步骤

处理步骤

1

用规定量的水稀释次氯酸钠。



2

用纸巾盖住呕吐物，洒上消毒液。



3

以向中央聚拢的方式擦拭清理。



4

将③放入双层塑料袋中，洒上消毒液。




5

用纸巾蘸取消毒液，擦拭周围，进行消毒。



6

将所有使用过的物品都放入塑料袋中。逐个扎紧塑料袋袋口，进行废弃处理。



- 开窗通风。
- 处理后30分钟内不要让人进入房间。
- 处理后，要仔细洗手。

发行日：2025年1月24日

发行方：文部科学省外国人学校保健卫生平台事务局（mediPhone 株式会社）

本资料于2025年1月24日，由文部科学省外国人学校保健卫生平台事务局制作，可能与政府给出的官方译法有出入，请加以注意。